

Avertissements agricoles

AVERTISSEMENT GRANDES CULTURES

destiné aux Agriculteurs du Lauragais, de la Piège et du Razès,
rédigé en collaboration avec la ferme de Loudes et la Chambre d'Agriculture.

N° 7C du 13/05/98

GRANDES CULTURES N°7

BLE :	Début floraison: rouilles, pucerons, risque Fusarioses: Traitement
POIS :	Floraison : couverture fongicide-insecticide

BLES

Actuellement les cultures les plus précoces sont en tout début floraison.

Selon nos conseils le dernier traitement devrait remonter à la dernière feuille étalée.

Il est donc nécessaire de renouveler maintenant la protection qui aura pour but :

- de maintenir les étages foliaires dans un état sanitaire satisfaisant vis à vis de l'Oïdium et des Rouilles;

* l'Oïdium toujours présent reste limité à F3-F2 sans une virulence importante

* la Rouille brune n'a pas connu l'explosion que l'on pouvait penser pour le début Mai; elle est presque absente des parcelles correctement traitées; par contre elle atteint la dernière feuille dans les autres cas.

* la Rouille jaune est également absente des cultures traitées, par contre explosive et très dommageable pour les autres (Blés tendres en particulier)

- d'assurer une protection des épis contre ces mêmes problèmes et surtout vis à vis d'un risque **Fusarioses** des épis; cette maladie peut s'installer dès le début floraison (sortie des étamines) en conditions d'humidités favorables

Les **Pucerons** sont visibles sur l'ensemble des parcelles; on peut les observer sur toutes les feuilles supérieures par colonies entières et ils commencent à monter dans les épis.

Intervenez début floraison avec:

HORIZON EW 1 L/HA plus un aphicide parmi

KARATE K	1	L
BEST	1	L
BAYTHROID	0.3	L
TALSTAR	0.05	L
DECIS	0.25	L
SERK EC	1.5	L
ENDURO	0.4	L


POIS PROTEAGINEUX

Ces cultures sont au stade floraison; pour l'instant on n'observe aucune maladie; à la fin de cette phase le maintien des pétales des fleurs collés sur les jeunes gousses en formation peut être la cause de développement de maladies (en particulier le Botrytis)

Dans les boutons floraux les **Pucerons** sont visibles et très nombreux

Si vous n'avez pas encore réalisé de traitement n'hésitez pas à intervenir (ou renouvelez si le 1^{er} traitement remonte à une quinzaine de jours)

CICERO	2	L/HA	plus
BEST	1.25	L	
KARATE K	1.25	L	
ENDURO	0.4	L	
DECIS	0.25	L	
SERK EC	1.5	L	
BAYTHROID	0.6	L	(risque Bruches)
TALSTAR	0.2	L	(risque bruches)



DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
ZAC D'ALCO - B.P. 3056
34034 MONTPELLIER CEDEX 01
Tél. : 04 67 10 19 50 - Fax : 04 67 03 10 21

PUBLICATION PÉRIODIQUE
IMPRIMERIE DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON
LE DIRECTEUR M. FREYDIER - N° D'INSCRIPTION 531 AD
ABONNEMENT ANNUEL - RÉGISSEUR DE RECETTES DE LA D.R.A.F.
Trésor Public de l'Hérault 00001003365